¿QUÉ HACER ANTE LA PRESENCIA DE SÍNTOMAS Y EN CASO DE SER PERSONA EN ALERTA COVID-19?

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS MIENTRAS SE ENCUENTRA EN SU HOGAR:

- 1. MANTENERSE EN SU HOGAR Y NO ASISTIR A SU LUGAR DE TRABAJO.
- 2. INFORMAR A LA JE<mark>FATURA DIRECTA</mark> Y AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS SOBRE SU SITUACIÓN.
- 3. CONSULTAR INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO, EL CUAL EVALUARÁ LA SITUACIÓN DE SALUD Y DETERMINARÁ LA NECESIDAD DE REALIZAR EXÁMENES DE DETECCIÓN DE CONTAGIO DE CORONAVIRUS.
- 4. EN CASO DE RESULTAR CONTAGIADO, DEBERÁ CUMPLIR CON UNA CUARENTENA DE 7 DÍAS DESDE INICIO DE SÍNTOMAS O FECHA TOMA DE MUESTRA.

EN CASO DE PRESENTAR SÍNTOMAS MIENTRAS SE ENCUENTRA EN EL LUGAR DE TRABAJO:

- 1. DAR AVISO INMEDIATO A LA JEFATURA DIRECTA Y AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS.
- 2. RETIRARSE DEL EDIFICIO INSTITUCIONAL Y CONSULTAR INMEDIATAMENTE A UN MÉDICO, EL CUAL EVALUARÁ LA SITUACIÓN DE SALUD Y DETERMINARÁ LA NECESIDAD DE REALIZAR EXÁMENES DE DETECCIÓN DE CONTAGIO DE CORONAVIRUS.
- 3. DE MANERA PREVENTIVA, EL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE RIESGOS GESTIONARÁ CON EL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS GENERALES LA LIMPIEZA Y DESINFECCIÓN DE TODA EL ÁREA DE TRABAJO DONDE ESTUVO LA PERSONA QUE PRESENTA SÍNTOMAS.

EN CASO DE SER PERSONA EN ALERTA COVID-19 POR CONTACTO CON CASOS CONFIRMADOS:

- 1. DAR AVISO INMEDIATO A LA JEFATURA DIRECTA Y AL ENCARGADO DE LA UNIDAD DE PREV<mark>ENCIÓN</mark> DE RIESGOS.
- 2. REALIZARSE UN EXAMEN CONFIRMATORIO SEA PCR O PRUEBA DE DETECCIÓN DE ANTÍGENOS DURANTE LOS 2 PRIMEROS DÍAS DESDE EL CONTACTO CON EL CASO CONSIDERANDO COMO DÍA 1 EL ÚLTIMO DÍA DE CONTACTO CON EL CASO. SI PRESENTA SÍNTOMAS DEBE SER DE INMEDIATO.
- 3. MEDIDAS DE AUTOCUIDADO: USO DE MASCARILLA QUIRÚRGICA, EVITAR ACTIVIDADES SOCIALES, LUGARES AGLOMERADOS, SIN VENTILACIÓN Y REALIZAR TELETRABAJO MIENTRAS NO TENGA LOS RESULTADOS DEL EXAMEN.

SÍNTOMAS

- FIEBRE >37,8°C (CARDINALES)
- PÉRDIDA BRUSCA DEL OLFATO Y DEL GUSTO (CARDINALES)
- TOS Y ESTORNUDOS
- CONGESTIÓN NASAL
- DIFICULTAD RESPIRATORIA
- AUMENTO DE LA FRECUENCIA RESPIRATORIA
- DOLOR DE GARGANTA AL COMER O TRAGAR FLUIDOS
- DOLORES MUSCULARES
- DEBILIDAD GENERAL O FATIGA
- DOLOR TORÁCICO
- CALOFRÍOS
- DIARREA.
- ANOREXIA O NÁUSEAS O VÓMITOS.
- CEFALEA O DOLOR DE CABEZA.